

L'EXPÉRIENCE DES CENTRES DE TRANSFUSION: COVID-19

STRATÉGIES POUR UNE RÉSERVE EN SANG SÛRE ET SUFFISANTE PENDANT UNE PANDÉMIE*

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions de stratégies que les services de transfusion et d'autres agences (par exemple, l'OMS, l'AABB, l'ISBT) ont trouvé utiles pendant le COVID-19.

Remarque : cette liste n'est pas exhaustive et vous devrez également considérer les stratégies appropriées dans le contexte de votre pays.


COMMUNICATION AVEC LA POPULATION

Maintenir des messages réguliers et simples à l'intention du public sur : l'engagement du service de transfusion à prendre des mesures de sécurité supplémentaires, aucune preuve que le COVID-19 est transmissible par transfusion, le don de sang est une activité essentielle avec des besoins constants (par exemple donner le nombre de poches de sang nécessaires par mois). Vous pouvez également envisager de demander à des célébrités ou à des dirigeants politiques de s'afficher en train de donner leur sang.




DIALOGUE AVEC LE GOUVERNEMENT

Un dialogue avec le gouvernement / les autorités sanitaires locales peut être utile, en leur rappelant que le sang est un traitement essentiel (définition de l'OMS). Les autorités peuvent envisager d'ajouter le don de sang à la liste des activités autorisées et permettre aux donneurs et aux équipes de collecte à se déplacer pour cette activité.



SÉCURITÉ DES DONNEURS ET DU PERSONNEL

Il est important de rassurer le personnel et les donneurs sur les mesures de sécurité supplémentaires mises en place. Parmi celles-ci, on peut citer la révision de la politique d'exclusion des donneurs, l'utilisation du don sur rendez-vous (afin de limiter les visites sans rendez-vous), fournir plus de zones pour le lavage des mains, des encas emballés individuellement pour les donneurs, et plus d'espace entre les lits des donneurs.



HÔPITAL ET CLINICIENS

L'établissement et le maintien d'un dialogue avec les hôpitaux /cliniciens peut être très utile pour faire correspondre l'offre de sang à la demande. Les cliniciens peuvent également être encouragés à adhérer à une gestion efficace du sang des patients, et à envisager de recourir à des mesures alternatives à la transfusion sanguine en période de pénurie, si possible. Une réduction des services non urgents (par exemple, la chirurgie élective) peut également être envisagée, si nécessaire.



ÉVALUER RÉGULIÈREMENT LA STRATÉGIE

*La situation concernant le COVID-19 évolue rapidement et les stratégies vont changer. Il est recommandé que les Sociétés nationales restent en contact permanent avec leurs propres autorités de santé publique afin de suivre de près la situation dans leur propre pays et de développer des stratégies en conséquence.

Contactez GAP pour plus d'informations.

